



<b>1</b>	<b>Top 10 meest gebruikte geneesmiddelen .....</b>	<b>2</b>
1.1	Inleiding.....	2
1.2	Methode.....	2
1.3	Top 10.....	3
1.3.1	Top 10 dagdosissen volgens therapeutische groep in 2012.....	3
1.3.2	Evolutie Top 10 dagdosissen volgens therapeutische groep .....	4
<b>2</b>	<b>Focus op Bloeddrukverlagers .....</b>	<b>6</b>
2.1	Aantal gebruikers in België .....	6
2.2	Aandeel gebruikers per leeftijdscategorie.....	7
2.3	Inname van bloeddrukverlagers op jaarbasis.....	8

# 1 TOP 10 MEEST GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN

## 1.1 INLEIDING

De top 10 geeft het hoogste verbruik gemeten in dagdosissen weer voor 2012, volgens therapeutische groep. Het gaat daarbij om geneesmiddelen afkomstig uit de publieke officina. Naast hun ranking volgens dagdosissen wordt ook hun ranking weergegeven volgens uitgaven en aantal patiënten.

## 1.2 METHODE

Alle gegevens (bedragen, aantallen, ...) zijn gebaseerd op geneesmiddelen afgeleverd aan CM-leden in publieke officina in 2012. Anno 2012 vertegenwoordigen CM-leden 42% van de Belgische bevolking.

## 1.3 TOP 10

### 1.3.1 TOP 10 DAGDOSISSEN VOLGENS THERAPEUTISCHE GROEP IN 2012

Tabel 1: Top 10 dagdosissen volgens therapeutische groep in 2012


RANG DDD - 2012	RANG ZIV - 2012	RANG AANTAL PATIENTEN - 2012	ATC	THERAPEUTISCHE GROEP	BELANGRIJKSTE STOFNAAM	HOOFDINDICATIE	€ DDD 2012 VOOR CM	# ZIV 2012 VOOR CM	# CM-PAT 2012	€ ZIV/DDD 2012	€ ZIV/PAT 2012
1	1	3	C03, C07, C08, C09	ANTIHYPERTENSIVA	Ramipril	Hoge bloeddruk	596,232,179	145,329,194	1,125,364	0.24	129
2	2	6	C10	HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN	Simvastatine	Cholesterolproblemen	234,142,947	107,712,925	715,459	0.46	151
3	9	8	B01	ANTITHROMBOTICA	Acetylsalicylzuur	Trombose	180,496,339	44,972,242	607,983	0.25	74
4	10	4	A02	MIDDELEN BIJ AANDOENINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET MAAGZUUR	Omeprazol	Maag-darm problematiek	146,673,942	43,342,611	785,137	0.30	55
5	26	14	G03	GESLACHTSHORMONEN EN MODULATOREN VAN HET GENITALE STELSEL	Desogestrel	Anticonceptiva	134,377,055	9,934,174	379,582	0.07	26
6	6	12	N06A	ANTIDEPRESSIVA	Escitalopram	Depressie	119,437,392	55,884,597	482,848	0.47	116
7	5	17	A10	ANTIDIABETISCHE MIDDELEN	Metformine	Diabetes	102,405,858	59,976,937	242,844	0.59	247
8	4	9	R03	MIDDELEN VOOR OBSTRUCTIEVE AANDOENINGEN VAN DE LUCHTWEGEN	Formoterol	Luchtwegproblemen	86,042,780	75,543,242	590,008	0.88	128
9	16	2	M01	ANTI-INFLAMMATOIRE EN ANTIREUMATISCHE MIDDELEN	Diclofenac	Pijn, ontsteking	66,962,434	22,919,714	1,350,365	0.34	17
10	20	23	C01	CARDIACA	Molsidomine	Angina pectoris	63,674,978	18,264,434	152,171	0.29	120

#### Duiding van de cijfers bij Tabel 1:

Deze top 10 vertegenwoordigt 80% van het totale volume ambulante geneesmiddelen, en 50% van de totale uitgaven. Dit verschil in percentage heeft te maken met het feit dat het hier enerzijds gaat om veelgebruikte geneesmiddelen, maar waarbij anderzijds de goedkopere geneesmiddelen sterk vertegenwoordigd zijn, o.a. bij de anti-hypertensiva.

### 1.3.2 EVOLUTIE TOP 10 DAGDOSISSEN VOLGENS THERAPEUTISCHE GROEP

Figuur 1: Evolutie 2002-2012 van top 10 volume ambulante geneesmiddelen volgens therapeutische groep




**Duiding van de grafiek:**

Bloeddrukverlagers staan al jarenlang onafgebroken op de eerste plaats inzake volume. De top 10 is relatief stabiel gebleven de laatste 4 jaar. De terugbetaling van acetylsalicylzuur (Asaflow®) eind 2008 verklaart sedert 2009 de aanwezigheid van antithrombotica op de derde plaats.

## 2 FOCUS OP BLOEDDRUKVERLAGERS


### 2.1 AANTAL GEBRUIKERS IN BELGIË

Figuur 2: Evolutie van het aantal gebruikers (\*) van antihypertensiva in de Belgische bevolking (extrapolatie op basis van het aantal CM-leden), volgens leeftijd. (\*): minimum 1 verpakking in het desbetreffende jaar



## 2.2 AANDEEL GEBRUIKERS PER LEEFTIJDSCATEGORIE


Figuur 3: Evolutie van het % aantal gebruikers(\*) van antihypertensiva in de Belgische bevolking (gebaseerd op basis van het aantal CM-leden), volgens leeftijd . (\*): minimum 1 verpakking in het desbetreffende jaar



Bij de volwassenen tot 44 jaar kreeg in 2012 slechts 5 procent deze medicatie. Bij de 45-64-jarigen is dat al een op de drie, bij de 65-84-jarigen twee op de drie. 80 procent van de 85-plussers neemt bloeddruckverlagers.

## 2.3 INNAME VAN BLOEDDRUKVERLAGERS OP JAARBASIS

Figuur 4: Procentuele verdeling van het aantal CM-gebruikers van sartanen (excl. valsartan) in 2012 volgens het aantal verbruikte tabletten



25 procent van de gebruikers gebruikte in 2012 270 tabletten of minder. Dit komt overeen met minder dan 9 maanden.